***BIOLOGIA CELULAR Y
MOLECULAR***

Biología tumoral

Los conocimientos biomédicos y las causas de cáncer

Metástasis diseminadas,
detectadas por PET
(positron emission
tomography). En
amarillo, captación de
fluorodesoxiglucosa
(FDG) indicando alto
metabolismo en el tejido
tumoral.

Tumores benignos versus malignos.

Características	Benignos	Malignos (“Cáncer”)
Diferenciación	Bien diferenciados. La estructura recuerda al tejido de origen.	Falta de diferenciación, anaplasia. Estructura con frecuencia atípica.
Crecimiento	Lento y progresivo; puede regresar. Mitosis escasas y normales.	Errático; lento o rápido. Mitosis numerosas y anómalas.
Invasión local	Ausente; crecimiento expansivo, que no infiltra tejidos normales vecinos.	Presente; infiltración de tejidos normales vecinos.
Metástasis	No	Si

CANCERES DE ORIGEN EPITELIAL: CARCINOMAS

Benigno

Epitelio de Revestimiento

EPITELIOMA, PAPILOMA

Epitelio Glandular

ADENOMA

Maligno

CARCINOMA

ADENOCARCINOMA

CANCERES DE ORIGEN MESENQUIMAL: SARCOMAS

Benigno

Tejido conectivo

FIBROMA

Tejido adiposo

LIPOMA

Tejido cartilaginoso

CONDROMA

Tejido óseo

OSTEOMA

Vasos sanguíneos

HEMANGIOMA

Vasos linfáticos

LINFANGIOMA

Músculo liso

LEIOMIOMA

Músculo estriado

RABDOMIOMA

Maligno

FIBROSARCOMA

LIPOSARCOMA

CONDROSARCOMA

OSTEOSARCOMA

ANGIOSARCOMA

LINFANGIOSARCOMA

LEIMIOSARCOMA

RABDOMIOSARCOMA

NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Maligno

Células hemopoyéticas

LEUCEMIAS

Tejido linfoide

LINFOMA

Incidencia y mortalidad por cáncer

Tumores benignos y malignos. Invasión y diseminación mestatásica.

INVASIÓN TUMORAL

1

Adhesión de las células tumorales a componentes de matriz, como laminina o fibronectina que, a su vez, pueden estar ligados a otros constituyentes.

2

Degradación de la matriz, ya sea por la secreción de enzimas líticas al medio extracelular o por la presencia de proteasas en la superficie de las células invasivas.

3

Locomoción de las células tumorales a través de la matriz modificada. No es necesaria la disolución de las matrices, la reducción de la organización molecular de las mismas es suficiente para permitir la migración de las células cancerosas.

Etapas de la progresión del cáncer de cuello uterino

Figura 20-9 *Biología molecular de la célula*, quinta edición (© Garland Science 2008 y Ediciones Omega 2010)

Resultados del Papanicolaou en la detección temprana de lesiones de cuello uterino.

A: Normal

B: Lesión precancerosa

C: Cáncer invasivo

(A)

10 μ m

(B)

(C)

Evolución clonal de un tumor, a partir de sucesivas rondas de mutación y proliferación hasta originar un “clon dominante” de células malignas.

Figura 20-11 *Biología molecular de la célula*, quinta edición (© Garland Science 2008 y Ediciones Omega 2010)

Proliferación y apoptosis en la génesis de tumores. Las células tumorales escapan a la autolimitación del crecimiento y de la supervivencia.

Figura 20-14 *Biología molecular de la célula*, quinta edición (© Garland Science 2008 y Ediciones Omega 2010)

Una pequeña población de células progenitoras (“stem”) mantiene a la mayoría de los tumores. La separación celular revela a la subpoblación progenitora.

Los cánceres pueden aparecer a partir de células progenitoras.

Figura 20-16 *Biología molecular de la célula*, quinta edición (© Garland Science 2008 y Ediciones Omega 2010)

Etapas del proceso metastásico.

Fenotipos de los tejidos tumorales

G= CRECIMIENTO (Growth)

G(-) ausencia de proliferación o acumulación

G(+) acumulación de células (proliferación > muerte)

I= INVASION

I(-) respeta la membrana basal o tiene cápsula conectiva

I(+) no respeta membrana basal o no tiene cápsula

M= METASTASIS

M(-) no existen crecimientos a distancia

M(+) asentamiento tumoral distante

FENOTIPOS COMBINADOS

G(-)I(+)M(-) Adenosis esclerosante de la mama, colesteatoma

G(-)I(+)M(+) Linfocitos y otras células sanguíneas, trofoblasto

→G(+)I(-)M(-) **Tumores benignos**

G(+)I(+)M(-) Tumores cerebrales, epiteloma basocelular

→G(+)I(+)M(+) **Tumores malignos (cáncer)**

CASCADA (O "ESCALERA") METASTÁSICA

ESTÍMULOS ANGIOGÉNICOS

HIPOXIA

FACTORES ANGIOGÉNICOS (VEGF, FGF)

RESPUESTA INFLAMATORIA

REPARACIÓN CICATRIZAL

Metástasis de adenocarcinoma colónico en pulmón

2 mm

Barreras a la metástasis.

Ineficiencia relativa del proceso de diseminación.

El “microambiente” tisular interviene en la génesis del tumor.

Figura 20-19 *Biología molecular de la célula*, quinta edición (© Garland Science 2008 y Ediciones Omega 2010)

Células cancerosas en cultivo y pérdida de inhibición de contacto.

Propiedades de las células transformadas en cultivo.

Pérdida del control del crecimiento:

Pérdida del control por densidad celular
Menor dependencia de factores exógenos
Independencia del anclaje
Inmortalización

Cambios morfológicos:

Menor extensión sobre el sustrato
Aumento de la relación núcleo/citoplasma
Anormalidades nucleolares
Heterogeneidad

Alteraciones de membrana:

Variaciones de la composición
Cambios en la fluidez
Perturbaciones en el transporte
Modificación de las cargas de superficie
Modificaciones en integrinas

Alteraciones en adhesividad, motilidad y deposición de matriz:

Disminución de la adhesión
Aumento de la motilidad
Alteraciones en la síntesis y deposición de colágeno, fibronectina y laminina

COMPORTAMIENTOS DESTACADOS DE LAS CÉLULAS TUMORALES DURANTE EL DESARROLLO DE CÁNCER:

- Más autosuficientes que las normales. *Ej. crecimiento en cultivo*
- Relativamente insensibles a señales antiproliferativas.
- Menos propensas a sufrir apoptosis.
- Defectuosas en controles que deberían “parar” la división. *Ej. hipoxia, daño DNA*
- Provocan “ayuda” del estroma normal y de su entorno.
- Inducen angiogénesis.
- Escapan de sus tejidos de origen (*invasión*).
- Sobreviven y crecen en ambientes extraños (*metástasis*).
- Son genéticamente inestables.
- Producen telomerasa o estabilizan sus telómeros.